



Limón Persa

Maduración del Brote

X-Cyte™

Balancedador de Nitratos™

Harvest More®
05-05-45

Harvest More®
10-55-10



Prefloración

Stimulate™

CaB™

Zinc

Harvest More®
05-10-27



Floración

X-Cyte™

CaB™

NBX™

Harvest More®
10-55-10



Aplicar 15 días después de la aplicación de prefloración

Limón Persa



División Celular

X-Cyte™

Harvest More®
05-10-27

Bio-Forge™



Aplicar en inicio de cuajado cuando tenga el fruto de 4 a 10mm de tamaño, realizar 2 aplicaciones con intervalo de 20 días.

Llenado de Fruto

X-Cyte™

Harvest More®
05-05-45

Magnesio™

Harvest More®
Calcio 18



Realizar 3 aplicaciones con intervalo de 14 días entre cada una.

Calidad de Fruto

N-Large™

Harvest More®
05-05-45

Magnesio™

Harvest More®
Calcio 18



Realizar 2 aplicaciones a los 45 y 30 días antes de cosecha.

Golden Pest Spray Oil™

Control efectivo y natural de Trips, Ácaros, Pulgones, Escamas, Minadores, Psíllido Asiático de los Cítricos (*Diaphorina citri*).



Root Feed™

Se recomienda la aplicación de Root Feed en "drench" para mantener el sistema radicular activo, eficiente y en constante crecimiento.

