

# ZORVEC™ **Encantia**®

**FUNGICIDA**

## FICHA TÉCNICA

ZORVEC™ **Encantia**® es una combinación única de consistencia y control, que te ayudará a lograr una mejor cosecha, incluso en condiciones ambientales difíciles. Una vez más, esto lo cambia todo.



## ESTO LO CAMBIA TODO, OTRA VEZ

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**Ingredientes activos:** Oxatiapiprolin + Famoxadona.

**Familia química:** Piperidinil tiazol isoxazolina (oxatiapiprolin) + oxazol (famoxadona).

**Presentaciones:** 1 L.

**Categoría toxicológica:** 4 (Banda Azul).

**Registro sanitario:** RSCO-MEZC-FUNG-303X-0393-X0069-425-30.88

### COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

**Ingredientes activos:** Oxatiapiprolin Equivalente a 30 g de i.a./L + Famoxadona Equivalente a 300 g de i.a./L.

**Ingredientes inertes:** Dispersantes, adyuvantes, emulsificantes, estabilizador, espesante, anticongelante, antiespumante, conservador, agente de suspensión y diluyente.

ZORVEC™ Encantia® tiene un mecanismo de acción diferenciado, el cual inhibe la producción de energía que necesita el hongo para germinar y crecer. Es eficaz en las diferentes etapas de vida del patógeno, protegiendo desde los nuevos brotes hasta la cosecha.

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Papa (30)*	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	500	Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días; cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; de ser necesario realice 1 aplicación adicional. Utilizar un volumen de agua suficiente para asegurar una correcta cobertura del cultivo.  * Ver recomendaciones detalladas en la sección de MANEJO DE RESISTENCIA

**Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas:** No entre, o permita que otras personas entren en el área aplicada, sin el adecuado equipo de protección en un lapso de 12 horas después de la aplicación. Durante el manejo, uso y aplicación, deberá utilizar el equipo de protección personal indicado en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de la parte izquierda de la etiqueta.

**Contraindicaciones:** No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones adversas (estrés) tales como: sequía, inundación, temperaturas bajas extremas, ataques de insectos, deficiencias nutricionales o cualquier otro factor que interfiera con el crecimiento del cultivo.

**Fitotoxicidad:** ZORVEC™ Encantia® no es fitotóxico a los cultivos mencionados ni a las dosis aquí recomendadas, siempre y cuando se sigan las instrucciones incluidas en el cuadro de recomendaciones de la etiqueta.

**Manejo de Resistencia:** Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes y lograr un mejor control es importante considerar lo siguiente: Prevención, Rotación y Dosificación. Hay que monitorear el cultivo y las condiciones climatológicas para iniciar el plan de manejo con un porcentaje de infección menor al 5%. Además, es importante alternar Zorvec™ Encantia® con productos de otros grupos químicos de diferentes mecanismos de acción y otros métodos de control. Finalmente, siempre hay que respetar las dosis y las frecuencias de aplicación.

Cultivo	LMR (ppm)*	LMR (ppm)*
	Oxatiapiprolin	Famoxadona
Papa	0.07	0.02

\* La fuente de referencia del Límite Máximo de Residuos (LMR) corresponde a lo autorizado por COFEPRIS/ \*\*EUA-EPA. Debido a que los valores de LMRs pudieran cambiar con el tiempo, se recomienda al usuario consultar las fuentes de referencia oficiales y para el caso de exportación queda bajo su responsabilidad el cumplimiento con los LMRs de los países destino.

### MODO DE ACCIÓN

ZORVEC™ Encantia® es un fungicida con movimiento acropétalo (ascendente) dentro de los tejidos de las plantas tratadas. Debido a su sistemicidad, tiene una residualidad que también protege a los nuevos brotes en el intervalo de aplicación en que se recomienda y, por esta razón, se recomienda principalmente en el periodo de mayor crecimiento vegetativo de los cultivos.