



Continúa con la tradición, control superior contra el Tizón.

Curzate[®]
60 DF

FUNGICIDA

Curzate[®] 60 DF es un producto de actividad sistémica-acropétala, con propiedades curativas y preventivas, el cual se debe aplicar de forma preventiva cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad.

Curzate[®] 60 DF combina en forma única varios modos de acción sobre el metabolismo de los hongos al estar constituido por una acetamida (cymoxanil) y le confiere una marcada acción antiesporulante.

BENEFICIOS




COMPORTAMIENTO EN LA PLANTA

Curzate® 60DF posee acción translaminar y sistémica local, además presenta rápida absorción, penetrando en los tejidos de las plantas en un periodo de 2 horas, con lo cual se logra una mejor protección de los cultivos.



EFFECTO DE HIPERSENSIBILIDAD

En todo momento y lugar Curzate® 60DF activa las defensas de las plantas, formando una barrera protectora que detiene el avance del hongo.



PROTECCIÓN Y CURACIÓN SIN RESISTENCIA:

Doble acción, preventivo y curativo, como resultado de su marcada acción antiesporulante.



De modo tal que sus células son capaces de reaccionar a la penetración del hongo, bloqueándolo y deteniendo su crecimiento hasta que muera.



SIEMPRE PRESENTE:

Se degrada en un aminoácido llamado glicina, que hace que su cultivo se torne más verde y más fuerte frente a condiciones climáticas difíciles.



Rápida absorción y resistencia al lavado por lluvias.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	MODO DE ACCIÓN
Papa (14) Jitomate (3)*	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.33 a 0.4	Al follaje: Cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad, o cuando aparezcan los primeros síntomas. Continúe con aplicaciones a intervalos de 3 a 5 días. Utilice los intervalos más cortos en condiciones en que la presión de la enfermedad sea mayor. No haga más de 8 aplicaciones por temporada.
Pepino, Melón, Calabacita, Sandía, Calabaza, Chayote (3)	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.20 a 0.30	Al follaje: Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 240 – 340L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: No entre, o permita que otras personas entren en el área aplicada sin el adecuado equipo de protección en un lapso de 24 hrs. después de la aplicación. Consulte la sección "Equipo de Protección" de la etiqueta. () **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

RED DE CUSTODIA Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO



Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0362-303-034-060

Banda Precautoria: Azul

Categoría toxicológica: 4

Titular del registro: CTVA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.