




Generación tras generación Curzate® M-8 tu mejor protección.

Curzate® M-8

FUNGICIDA

Curzate® M-8 es un producto de actividad sistémica acropétala y de contacto, con propiedades curativas y preventivas que evitan el establecimiento de patógenos del orden de los peronosporales en los cultivos de papa, y tomate.

BENEFICIOS



Curzate® M-8 está constituido por una acetamida (cymoxanil) y un ditiocarbamato (mancozeb), lo cual lo hace efectivo contra cepas de hongos resistentes a las fenilamidas y le confiere una marcada acción antiesporulante.



Posee acción translaminar y sistémica local que consiste en una rápida absorción, penetrando en la hoja y logrando con esto, una mayor protección en su interior.



Por su efecto de hipersensibilidad, dos horas después de la aplicación, engrosa las paredes celulares y los tejidos de la planta, despertando sus defensas naturales.



Curzate® M-8 se degrada de un aminoácido llamado glicina, que hace que su cultivo se torne más verde y más fuerte frente a condiciones climáticas difíciles.



Por su doble acción, preventiva y curativa, aumenta las defensas del cultivo, pues forma una barrera protectora que detiene el avance del hongo.



Rápida absorción y resistencia al lavado por lluvias.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS* kg/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Tomate (5)	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 - 3	Quando las condiciones climáticas sean propicias para el inicio de la infección y/o el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Continúe con aplicaciones a intervalos de 5 a 7 días. Utilice los intervalos más cortos cuando la presión de la enfermedad sea mayor. No haga más de 9 aplicaciones por temporada.
Papa (14)	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 - 3 1	Follaje: Cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad, o cuando aparezcan los primeros síntomas. Continúe con aplicaciones a intervalos de 5 a 7 días. Utilice los intervalos más cortos en condiciones en que la presión de la enfermedad sea mayor. No haga más de 8 aplicaciones por temporada. Semilla: Sumerja los tubérculos en la solución utilizando 200 Lt de agua por tonelada de semilla. Cubra o incorpore derrames de semilla tratada con este producto.

*Utilice las dosis altas cuando la presión de la enfermedad sea más alta. () Intervalo de seguridad = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL) Sin límite. **Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas:** No entre o permita que otras personas entren en el área aplicada sin el adecuado equipo de protección en un lapso de 24 h después de la aplicación. Consulte la sección "Equipo de Protección" de la etiqueta.



RED DE CUSTODIA
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO

Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com

Registro Sanitario: RSCO-MEZC-1322-001-002-072

Banda Precautoria: Verde

Categoría toxicológica: 4

Titular del registro: DuPont Mexicana, S. de R.L. de C.V.,

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

