

USO AGRÍCOLA



Prodigy[®]

INSECTICIDA

espinetoram + metoxifenocida INSECTICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA

INGREDIENTES ACTIVOS:	COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
Espinetoram: 3'-O-etil-5,6-dihidro-spinosyn J; mezcla de 50-90% (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxi-3-O-etil-2,4-di-O-metil- α -L-manopiranosiloxi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahydro-6-metilpiran-2-iloxi]-9-etil 2,3,3a, 4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahidro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona		5.66
3'-O-etil-spinosyn L: y 50-10% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxi-3-O-etil-2,4-di-O-metil- α -L-manopira-nosiloxi)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahydro-6-metilpiran-2-iloxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12, 13,14,16a,16b- tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona (Equivalente a 60 g/L a 20 °C)		
Metoxifenocida: N-tert-butil-N'-(3-metoxi-o-toluoil)-3,5-xilohidrazida (Equivalente a 300 g/L a 20 °C)		28.30
INGREDIENTES INERTES: Antiespumante, anticongelante, conservador, dispersante, espesantes, humectante, diluyente.		66.04
	TOTAL:	<u>100.00</u>

Registro Sanitario No.: RSCO-MEZC-INAC-0103X-0164-X0091-064-33.96

**Puede ser
nocivo en caso
de ingestión**

**Puede ser nocivo
por el contacto
con la piel**

**Puede ser
nocivo si se
inhala**

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

CORTEVA MX, S. A. DE C.V.

Lago Alberto No. 319, Piso 17, Col. Granada, C.P. 11520,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
Tel. 33 36797912

HECHO EN ESTADOS UNIDOS

TM® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. ©Corteva



PRECAUCIÓN

REV. 17/03/2023

" ESTE DOCUMENTO TIENE FINES ILUSTRATIVOS ÚNICAMENTE. NO ES UNA ETIQUETA REAL."

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, lentes protectores, botas y gorra. Durante la preparación y aplicación del producto, hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicaciones. No destape las boquillas con la boca. Al terminar las labores, lave su equipo de aplicación, así como todas las herramientas que haya utilizado. Enjuague sus manos aun con los guantes puestos, descontámelos y proceda a retirar el resto de su equipo de protección, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. La ropa de trabajo se debe lavar con agua y jabón antes de volver usarla y separada del resto de ropa de uso común.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX)

Emergencia de transportación SETIQ (800)-00-21-00

Emergencia Médica: (800)-00-928-00

Servicio gratuito las 24 hrs.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Si hay contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua por 15-20 minutos. En caso de que la víctima este usando lentes de contacto, remuévalos en los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Entre en contacto inmediatamente con un médico o un centro de control de intoxicaciones.
- **Si hay contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Lavar la ropa contaminada antes de reusar.
- **Si se inhala:** Lleve a la persona al aire fresco. Si los síntomas continúan, consiga atención médica. Puede ser necesaria la respiración artificial/oxígeno.
- **Si se ingiere:** Entre en contacto con un médico o un centro de control de intoxicaciones. Hacer que la persona beba un poco de agua, si se puede tragar. No provocar el vómito, solo en caso de que sea consejo del médico. No dar nada por la boca si se encuentra inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: spinosines (espinetoram) y diacilhidracinas (metoxifenocida)

Antídoto: No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de Intoxicación: Por inhalación, puede causar irritación en las vías respiratorias. Por contacto con la piel, puede causar reacción alérgica en la piel. Por contacto con ojos, puede producir enrojecimiento. La ingestión de en grandes cantidades puede causar irritación gastrointestinal y malestar general. En caso de presentar signos o síntomas de intoxicación, llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para asesoría en el tratamiento. NO induzca el vómito a menos que así sea indicado por el médico o el centro de control de intoxicaciones y nunca administre nada vía oral a una persona inconsciente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

"Este producto es tóxico para abejas expuestas al tratamiento dentro de las tres horas siguientes a la aplicación. No aplique el producto cuando se esté planeando hacer liberaciones de abejas para la polinización del cultivo. Es necesario esperar al menos tres horas después de la aplicación del producto para iniciar con el programa de liberación de abejas. Una vez que el follaje se encuentre seco después de la aplicación del producto, el riesgo de toxicidad sobre abejas desaparece".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR O CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO. ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA PECES Y **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

GARANTÍA

CORTEVA MX, S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **CORTEVA MX, S.A. DE C.V.**, esta reembolsará el importe pagado por el producto. Este producto se vende en el entendido de que el comprador asume todos los riesgos del uso, manejo, almacenaje, y disposición del producto (indicados en esta etiqueta), y están fuera del control del vendedor y, que puedan resultar en pérdidas o daños al comprador o a cualquier tercero en sus personas o bienes. Por ningún motivo **CORTEVA MX, S.A. DE C.V.** asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y CONTRA LAS ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

PRODIGY® es un insecticida hecho a base de espinetoram y metoxifenocida, no sistémico que actúa por ingestión y contacto. Su modo de acción al nivel del sistema nervioso central, así como emulador de la síntesis de la ecdisoma y no lo expone a resistencia cruzada con insecticidas de diferente grupo. Se recomienda para el control de las plagas descritas en esta etiqueta. Cualquier decisión de aplicar el producto fuera de estas recomendaciones es responsabilidad de la persona que lo realice.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS mL/ha	RECOMENDACIONES
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor (1)	Palomilla dorso diamante <i>Plutella xylostella</i>	100-150	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecte más del 50% de incidencia de la plaga. Utilizar un volumen de agua adecuado para asegurar una buena cobertura del follaje.
Fresa (3)	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	100-150	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Utilizar un volumen de agua adecuado para asegurar una buena cobertura del follaje.
Pepino, Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Chayote (3)	Gusano barrenador <i>Diaphania</i> sp.	75-150	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecte más del 50% de incidencia de la plaga. Utilizar un volumen de agua adecuado para asegurar una buena cobertura del follaje.
Berenjena, Chile, Pimiento morrón, Jitomate (tomate rojo), Tomate de cáscara (1)	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	100-150	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Utilizar un volumen de agua adecuado para asegurar una buena cobertura del follaje.
Garbanzo (7)	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	100-150	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecte más del 50% de incidencia de la plaga. Utilizar un volumen de agua adecuado para asegurar una buena cobertura del follaje.
	Gusano del fruto <i>Heliothis</i> spp.	150-300	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Utilizar un volumen de agua adecuado para asegurar una buena cobertura del follaje.
Sorgo (21) Maíz (28)	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	100-200	Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Utilizar un volumen de agua adecuado para asegurar una buena cobertura del follaje.

() Intervalo de seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Durante la preparación y aplicación del producto **PRODIGY®**, siempre utilice el equipo de protección personal señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, agréguese el producto y complete el volumen. Mantenga en constante agitación. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre, asegurando un buen cubrimiento del follaje de las áreas infestadas. Puede mezclarse con dispersantes y se recomienda usar adherente. Se recomienda el uso de un antiespumante.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando existe posibilidad de lluvia. No aplicar si el viento excede los 8 km/hr. No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación, para conocer si producen efectos fitotóxicos.

INCOMPATIBILIDAD: Si se desea mezclar, se podrá hacer con productos registrados en el cultivo indicado, haciendo una prueba física previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA. PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.