Continúa con la tradición, control superior contra el Tizón.

Curzate®
60 DF

FUNGICIDA

Curzate ® 60 DF es un producto de actividad sistémica-acropétala, con propiedades curativas y preventivas, el cual se debe aplicar de forma preventiva cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad.

Curzate ® 60 DF combina en forma única varios modos de acción sobre el metabolismo de los hongos al estar constituido por una acetamida (cymoxanil) y le confiere una marcada acción antiesporulante.

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2023 Corteva

Curzate® 60 DF

FUNGICIDA

BENEFICIOS

COMPORTAMIENTO EN LA PLANTA

Curzate® 60DF posee acción translaminar y sistémica local, además presenta rápida absorción, penetrando en los tejidos de las plantas en un periodo de 2 horas, con lo cual se logra una mejor protección de los cultivos.

PROTECCIÓN Y CURACIÓN SIN RESISTENCIA:

Doble acción, preventivo y curativo, como resultado de su marcada acción antiesporulante.

SIEMPRE PRESENTE:

Se degrada en un aminoácido llamado glicina, que hace que su cultivo se torne más verde y más fuerte frente a condiciones climáticas difíciles.

EFECTO DE HIPERSENSIBILIDAD

En todo momento y lugar Curzate® 60DF activa las defensas de las plantas, formando una barrera protectora que detiene el avance del hongo.

De modo tal que sus células son capaces de reaccionar a la penetración del hongo, bloqueándolo y deteniendo su crecimiento hasta que muera.

Rápida absorción y resistencia al lavado por lluvias.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	MODO DE ACCIÓN
Papa (14)	Tizón Tardío *(Phytophthora infestans)*	0.33 a 0.4	Al follaje: Cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad, o cuando aparezcan los primero síntomas. Continúe con aplicaciones a intervalos de 3 a 5 días. Utilice los intervalos más cortos en condiciones en que la presión de la enfermedad sea mayor. No haga más de 8 aplicaciones por temporada.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: No entre, o permita que otras personas entren en el área aplicada sin el adecuado equipo de protección en un lapso de 24 hrs. después de la aplicación. Consulte la sección "Equipo de Protección" de la etiqueta. **( ) Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

RED DE CUSTODIA PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO — Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com

Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0362-303-034-060
Banda Precautoria: Azul
Categoría toxicológica: 4
Titular del registro: DuPont Mexicana, S. de R.L. de C.V.,

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2023 Corteva