PIÑAS DE PRIMERA.

SOLUCIONES CORTEVA PARA **PIÑA.**

CORTEVA™
agriscience

SIGAMOS CRECIENDO

Visítanos en **www.corteva.mx**

Vydate® L

INSECTICIDA

PROTECCIÓN QUE REFUERZA EL CRECIMIENTO.

Vydate® L es un carbamato, sistémico acropétalo y basipétalo para aplicación en riego por goteo, para el control de toda clase de nemátodos endo o ectoparásitos. Es un insecticida y nematicida de amplio espectro con efecto nematostático.
Aplicado al suelo, Vydate® L paraliza toda clase de nemátodos que atacan raíces, bulbos y tubérculos.

Nemátodos

BENEFICIOS

- Penetración rápida.
- Persistencia dentro de la planta.
- Insecticida y nematicida con efecto nematostático.
- Práctico sistema de aplicación.
- Es lo suficientemente lipofílico para penetrar los tejidos de la planta cuando se aplica al follaje.

Protección con Vydate® L

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Piña (30)	Piojo harinoso *(Dysmicoccus brevipes)*	2-4	Para control de nemátodos y control temprano de insectos aplique uno de los siguientes tratamientos: **Tratamiento de pre-siembra:** Haga una aplicación total una semana antes de la siembra e, incorpore a una profundidad de 10 a 15 cm. **Tratamiento a la siembra (dentro de la semana subsecuente a la siembra):** Haga una aplicación total. **Tratamiento al suelo con sistemas de riego por goteo:** Consulte la sección "Aplicación con sistemas de riego por goteo". **Tratamientos subsecuentes:** Para obtener los mejores resultados, se deben hacer aplicaciones complementarias de Vydate® L al follaje con equipo terrestre a intervalos de 2 a 4 semanas. Empiece estas aplicaciones cuando las raíces de la piña empiecen a crecer. **Aplique directamente al suelo con el sistema de riego por goteo a intervalos de 7 a 15 días**. Consulte la sección "Aplicación con sistemas de riego por goteo". **Contraindicaciones:** No aplique más de 46 L de Vydate® L/ha por temporada. No pastoree ganado en un período de 30 días después de aplicar este producto.
	Nemátodos *(Meloidogyne* spp. *Rotylenchus* spp. *Helicotylenchus* spp. *Criconemoides* spp. *Pratylenchus* spp.*)*		

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas:** No entre o permita que otras personas entren en el área aplicada sin el adecuado equipo de protección por un período de 48 hrs después de la aplicación.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Vydate® L No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0152-001-014-024 Categoría toxicológica II (Banda roja).

CORTEVA™ agriscience

Exalt™

INSECTICIDA

Palgus™

INSECTICIDA

INSECTICIDAS DE ORIGEN NATURAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS.

Exalt™ / Palgus™ son insecticidas formulados a base de **Spinetoram,** ideales para el control del barrenador de la hoja; debido a su modo de acción, ejerce un contundente efecto de derribe y un prolongado periodo de control.



Barrenador del fruto

BENEFICIOS

- Rápido efecto de control (protege desde los primeros minutos después de su aplicación).
- Doble modo de acción: ingestión y contacto.
- Brindan un excelente control residual debido a su movimiento translaminar en los tejidos de la planta.

Exalt™ / Palgus™ proporcionan un control residual sobre un amplio espectro de insectos plaga, a bajas dosis de uso.

Protección con Exalt ™ / Palgus™

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Piña (7)	Barrenador del fruto *(Thecla basilides)*	250 - 500	Realizar una aplicación dirigida al follaje al detectar la presencia de la plaga al inicio de la floración. Utilizar un volumen de agua adecuado al tamaño de cultivo, equipo y técnica de aplicación.

Tiempo de reentrada en las áreas tratadas: 4 horas después de la aplicación. **( ) Intervalo de seguridad en días:** días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombres de los productos: Exalt™/Palgus ™ No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0103X-301-064-006. Categoría toxicológica 5 (Banda verde).

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

Intrepid™

INSECTICIDA

CONTRA LARVAS DE LEPIDÓPTEROS, CONTROL PROLONGADO.

Intrepid™ es un insecticida regulador del crecimiento (IRC) en larvas del orden lepidópteros que actúa por ingestión como un compuesto acelerador de la muda.

Barrenador del fruto

Protección con Intrepid™

BENEFICIOS

- Insecticida regulador del crecimiento.
- Valiosa herramienta para el Manejo Integrado de Plagas (MIP).
- Dosis bajas de aplicación.
- Mecanismo de acción único.
- Alto efecto residual.
- Aprobado en el cuadro básico APEAM.
- Control de lepidópteros en estados inmaduros.

Intrepid™ imita la hormona natural de la muda del insecto, induciendo a las larvas a una muda prematura letal, encontrándose impedidas de deshacer su vieja cutícula por lo que mueren de deshidratación e inanición después de haber ingerido el tejido vegetal tratado con Intrepid™.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Piña (25)	Barrenador del fruto *(Thecla basilides)*	300-400	Inicie la aplicación cuando la planta se encuentre en el inicio de la formación del fruto y de la floración, en la etapa de "cono rojo". Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días. Para asegurar un mejor control se recomienda agregar un coadyuvante a dosis de 0.5 mL/L de agua.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas. **( ) Intervalo de seguridad:** días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Intrepid™ No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0102L-301-342-023 Categoría toxicológica 5 (Banda Verde).

CORTEVA™ agriscience

Spintor™ 12SC

INSECTICIDA

ORIGEN NATURAL Y CONTROL EFICAZ.

Spintor™ 12 sc es un insecticida de origen natural perteneciente a la clase de productos **NATURALYTE**. Su ingrediente activo **(Spinosad)** controla al barrenador del fruto con una efectiva y rápida acción.

Spintor™ 12 sc afecta el sistema nervioso de los insectos, actuando como activador de los receptores nicotínicos de la acetilcolina.

Barrenador del fruto

BENEFICIOS

- Actúa por ingestión y por contacto.
- Prolongado periodo de control.
- Acción translaminar en los tejidos de la planta.
- Corto intervalo de cosecha (7 días).
- Aprobado en el cuadro básico APEAM.

Protección con Spintor™12 sc

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Piña (7)	**Barrenador del fruto** *(Thecla basilides)*	300-400	Revisar las inflorescencias (conos rojos) para localizar oviposiciones sobre los pétalos de las flores individuales. Iniciar con las aplicaciones cuando se detecten los primeros huevecillos. Realizar hasta 3 aplicaciones a intervalos de 8-10 días, para mantener protegido todo el periodo de floración; especialmente si se presentan lluvias que puedan lavar las aplicaciones. Utilizar un volumen de agua suficiente para cubrir los frutos y coronas, el cual puede ser de 750 litros/ha.

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas. **( ) IS: Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Spintor™12sc No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0101Y-303-064-012 Categoría toxicológica 5 (Banda Verde)

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

Entrust™ SC

INSECTICIDA

CONQUISTAMOS LAS FRONTERAS.

Entrust™SC es un insecticida con aprobación de uso en cultivos con manejo orgánico. Su formulación líquida a base de **Spinosad** cuenta con un modo de acción translaminar en los tejidos de la planta; actúa por ingestión y contacto directamente en el sistema nervioso del barrenador del fruto, sin exponerlos a desarrollar resistencia cruzada con insecticidas de diferente grupo químico.

Protección con Entrust™ SC

BENEFICIOS

- Las bajas dosis requeridas por hectárea y su favorable perfil toxicológico en mamíferos (categoría 5, banda verde) se traduce en un corto periodo de reentrada al área tratada.
- Herramienta ideal para programas de rotación de insecticidas.
- Altamente efectivo para el control del barrenador del fruto.
- Ideal para ser utilizado en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).
- Aprobado en el cuadro básico APEAM.

OMRI LISTED

For Organic Use

Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas. **( ) IS: Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin limite

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Piña (SL)	**Barrenador del Fruto** *(Thecla basilides)*	150 – 200	Aplicar desde el inicio de la floración, cuando la inflorescencia se encuentre en estado de cono rojo. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre asegurando un buen cubrimiento de las áreas infestadas. No aplicar Entrust™ sc más de 2 veces consecutivas ni más de 3 en todo el periodo de floración para evitar generar resistencia en la plaga. Usar a intervalos de 7 días entre cada aplicación para mantener protegido el fruto de las larvas que se presenten en ese periodo de tiempo.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Nombre del producto: Entrust™sc No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0101Y-0195-064-22.14 Categoría toxicológica 5 (Banda Verde)

CORTEVA™ agriscience

Galant™ Ultra

HERBICIDA

MARCA SU TERRITORIO GALANT™ ULTRA.

Galant™ ultra es un herbicida graminicida post emergente que controla de manera rápida y efectiva la maleza que compite con el cultivo.
Se recomienda para controlar malezas gramíneas anuales y perennes, lo cual lo convierte en un herbicida totalmente selectivo a cultivos de hoja ancha.
Se absorbe principalmente por las hojas, para luego ser translocado a los tejidos meristemáticos de la maleza, inhibiendo su crecimiento y controlando su desarrollo.

Malezas

BENEFICIOS

- Versatilidad en todo terreno.
- Mayor rendimiento por litro aplicado*.
- Control selectivo incrementado.
- Mecanismo de acción reforzado.
- Es totalmente selectivo en cultivos de hoja ancha.
- Se aplica sobre la maleza, con resultados a 4 días de aplicación y secado total a 15 días.

Protección con Galant™ Ultra

* de acuerdo a resultados de pruebas internas

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Piña (40)	**Zacate frente de toro** *(Digitaria sanguinalis)* **Zacate amargo** *(Digitaria insularis)* **Zacate caracolillo o guatemalteco** *(Eragrostis ciliaris)*	2- 3 L/ha	Es un herbicida selectivo al cultivo de piña en todas sus etapas, por lo que se debe realizar una aplicación en post-emergencia en cualquier momento en que las malezas de hoja angosta (pastos) se presenten de manera abundante. Preferentemente aplicar cuando los pastos tengan de 10 a 20 cm de altura y en etapa de crecimiento activo, con buena humedad en el suelo. Aplíquelo bajo las prácticas y equipos comúnmente usados en este cultivo (manuales y de tractor) manteniendo las dosis recomendadas en esta etiqueta.

( ) **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas:** 12 h.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Galant™ Ultra No. De Registro Sanitario:RSCO-HEDE-0201Q-0301-009-010.51 Categoría toxicológica 5 (Banda verde).

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

SOLUCIONES PIÑA.



Entrust™ SC
INSECTICIDA

Exalt™
INSECTICIDA

Intrepid™
INSECTICIDA

Palgus™
INSECTICIDA

Spintor™ 12SC
INSECTICIDA

Vydate® L
INSECTICIDA

Galant™ Ultra
HERBICIDA

Los datos mostrados en este documento son solamente una referencia y no constituyen garantía alguna sobre resultados específicos.
Los resultados del uso del producto pueden variar en cada caso, dependiendo de las diferentes condiciones climáticas, geográficas y de manejo del cultivo.

CuidAgro®
PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

CORTEVA™
agriscience