

“USO AGRÍCOLA”



Dow AgroSciences

QuintecTM

FUNGICIDA

quinoxifen

FUNGICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Quinoxifen: 5, 7-dicloro-4-quinolil-4-fluorofenil éter.
(Equivalente a 250 g i.a./L a 20°C)

% EN PESO

22.58

INGREDIENTES INERTES:

Anticongelante, dispersante, surfactante, agente espesante,
antiespumante, antimicrobial y diluyente.

77.42

TOTAL: 100.00

REGISTRO: RSCO-FUNG-0302A-301-064-023

Puede ser nocivo
por el contacto
con la piel

Puede ser
nocivo en caso
de ingestión

Puede ser
nocivo
si se inhala

TITULAR DEL REGISTRO:

Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.

PLANTA: Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302,
Cd. Industrial Xicoténcatl, 90431,
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.
Tel. (241) 418-9300

OFICINAS (tels): (33) 3678-2400

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.

Bld. Emilio Sánchez Piedras 302,
Cd. Industrial Xicoténcatl, 90431,
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. Tel. (241) 418-9300

® TM Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

HECHO EN REINO UNIDO

PRECAUCIÓN

REV.02/05/2017

“ ESTE DOCUMENTO TIENE FINES ILUSTRATIVOS ÚNICAMENTE. NO ES UNA ETIQUETA REAL.”

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Perjudicial si se ingiere, inhala o es absorbido por la piel. Evitar el contacto directo con la piel, ojos y boca y no respirar el rocío de la aplicación. Usar equipo protector adecuado, consistente en delantal impermeable, lentes protectores, guantes de hule resistentes a químicos que cubran el antebrazo, sombrero, camisa de manga larga y pantalones largos, cuando mezcle, cargue y aplique este producto. La ropa contaminada deberá lavarse por separado en agua caliente antes de volver a usarla. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01 (800) 009-2800 o 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 (Servicio de Información Toxicológica), mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: quinolinas.

Signos y síntomas de intoxicación: este producto puede causar leve irritación con daño a la córnea. Una exposición prolongada es probable que cause una irritación significativa de la piel. Puede causar una reacción alérgica en la piel de individuos susceptibles. Una simple exposición por inhalación (horas) es probable que provoque efectos adversos.

Antídoto y tratamiento: no hay antídoto específico contra la intoxicación con este producto, aplicar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA. Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de México S.A. de C.V., ésta reembolsaría el importe pagado por el producto. Por ningún motivo Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL. Quintec™ es un fungicida de acción preventiva y traslaminar, se fija rápidamente en las ceras de la cutícula. Lluvias ocurridas 1 hora después de la aplicación no afectan su eficacia. Las dosis aquí indicadas son exclusivamente para campo, no recomendables para invernaderos/planteros. Permite mantener controlada la enfermedad que se indica a continuación en los cultivos abajo especificados:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES
Calabacita, Pepino, Melón, Sandía (3)	Cenicilla de las Cucurbitáceas <i>Erysiphe cichoracearum</i>	200-300 mL/ha	Iniciar las aplicaciones de manera preventiva o cuando existan condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Vid (14)	Cenicilla de la Vid <i>Uncinula necator</i>	200-300 mL/ha	Iniciar las aplicaciones antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.
Chile, Chile bell, Jitomate, Tomate de cáscara, (3)	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	100-300 mL/ha	Iniciar las aplicaciones antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días.
Fresa, Frambuesa, Arándano, Grosella, (3)	Cenicilla <i>Sphaerotheca macularis</i>	200-300 mL/ha o 0.3-0.5 mL/ L de agua	Iniciar las aplicaciones antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de siete días. Volumen de aplicación recomendado 600-700 L/ha.
Lechuga (1)	Cenicilla polvorienta <i>Erysiphe cichoracearum</i> f.sp. <i>lactucae</i>	100-300 mL/ha (equivalente a 0.4-1.2 mL/L de agua)	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 8 días. Iniciar las aplicaciones de manera preventiva. Aplicar la dosis alta en zonas con historial de alta presión de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales con humedad relativa mayor a 50% y temperatura promedio 18°C se mantengan por periodos prolongados. Se recomienda el uso de coadyuvante a una dosis de 1.0 mL/L de agua. Volumen de agua recomendado 250 L/ha.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 12 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Agite el producto antes de usarse. Llene el tanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de Quintec™ necesaria y agitando complete el volumen de agua necesario. Agite hasta producir una mezcla uniforme. Las dosis indicadas por hectárea deben aplicarse en suficiente cantidad de agua según sea el sistema de producción, el equipo de aplicación y el tamaño de las plantas, con el fin de que se obtenga una buena cobertura de aplicación en el follaje.

Quintec™ es un fungicida con acción preventiva y traslaminar, por lo que deberá de aplicarse antes de los primeros síntomas de la enfermedad o bien cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo y diseminación del patógeno.

CONTRAINDICACIONES. No aplicar cuando amenacen lluvias al momento de la aplicación, ni con vientos a velocidad mayor de 8 km/hr.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina, ni con fertilizantes foliares que contengan boro. No se recomienda mezclar quinoxifen con oxiclورو de cobre ni con los siguientes ingredientes activos cuando estos se encuentren como polvo humectable: Benalaxyl, Folpet, y Fosetyl-Al. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de incompatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.